

**Description de deux Curculionides nouveaux  
de la faune française [COL.]**

par A. HUSTACHE.

**Ceuthorrhynchus Pueli**, n. sp. (♀). — Taille et facies de *C. rusticus* Gyllh., mais en différant à première vue par son prothorax à ponctuation fine et superficielle et à bord antérieur épaissi, en forme de bourrelet lisse.

Ovale, noir; dessous à squamules blanchâtres, grandes, peu serrées; dessus à squamosité brune parsemée de quelques squamules grisâtres.

Rostre noir, un peu luisant, glabre, fort, médiocrement courbé, de la longueur du prothorax, entièrement ponctué et sillonné latéralement à la base.

Antennes grêles, testacées, avec le scape et la massue rembrunis; scape renflé au sommet; funicule de 7 articles; le premier trois fois aussi long que large et presque aussi épais au sommet que l'extrémité du scape; le deuxième beaucoup moins épais que le 1<sup>er</sup>, mais aussi long; les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> encore du double aussi longs que larges; les trois derniers globuleux; massue oblongue, entièrement pubescente, à peine aussi longue que les 4 articles précédents.

Tête ponctué, à squamules peu serrées; front plan; vertex nettement caréné; yeux ronds, grands, peu saillants.

Prothorax un peu moins long que large à la base, largement mais peu fortement resserré derrière le bord antérieur, qui est relevé et épaissi en forme de fin bourrelet lisse; bords latéraux élargis derrière leur milieu, où se montrent plusieurs tubercules dont l'un plus saillant, et de là faiblement resserrés vers la base; base fortement bisinuée et finement relevée; un fin sillon médian interrompu en son milieu; disque à ponctuation serrée, ruguleuse, mais peu profonde, et couvert de squamules petites brunes, éparses. Écusson triangulaire, squamulé.

Élytres plus larges à la base que le prothorax; calus huméral peu saillant, fortement tuberculé; bords latéraux un peu élargis au delà des épaules, faiblement convergents vers le sommet, où ils sont séparément arrondis; subplans; stries assez fortes, obsolètement ponctuéées, les externes avec quelques squamules blanches; interstries plans, 3 fois aussi larges que les stries; les six premiers granulés-ridés, les 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> ayant de plus quelques tubercules vers le sommet, les suivants entièrement et fortement tuberculés, particulièrement dans la région du calus huméral; tous les interstries couverts de

squamules allongées, brunes, peu serrées, et de quelques autres grisâtres, éparses.

Pattes fortes, squamulées, à ponctuation grosse et serrée; fémurs claviformes, tous avec une forte dent triangulaire; tibias noirs; tarses bruns de poix, pubescents, à dernier article fortement spongieux en dessous; ongles dentés.

Dessous noir, ponctué, à squamules blanchâtres, grandes, peu serrées.

Pygidium noir, entier, rugueux, squamulé.

Long. 5 mill. environ.

Pyénées-Orientales : Bourg-Madame. Un exemplaire (ma collection).

Cette espèce, voisine de *C. rusticus* Gyll. par sa taille, sa forme, son revêtement et les tubercules latéraux de ses élytres, s'en distingue cependant facilement par son prothorax moins fortement resserré derrière le bord antérieur qui est aussi moins relevé et de plus épaissi, sa ponctuation beaucoup moins profonde, presque superficielle; les élytres sont de plus un peu élargis vers les épaules et offrent dans leur ensemble une forme moins parallèle, plus triangulaire.

Dédié à notre collègue, M. L. PUEL, à qui je dois la connaissance de cette espèce et qui m'a généreusement abandonné cet unique exemplaire.

**Bagous (Helmidomorphus) denticulatus**, n. sp. — Noir, entièrement couvert de petites squamules terreuses; antennes, tibias et tarses entièrement testacé clair.

Rostre noir, épais, cylindrique, faiblement courbé, presque aussi long que le prothorax, le dessus à ponctuation très fine, serrée à la base, très éparse au sommet, glabre et un peu brillant.

Antennes insérées vers le milieu du rostre, testacé clair, glabres, à l'exception du tiers apical de la massue qui est imperceptiblement feutré; scape médiocrement renflé au sommet; 1<sup>er</sup> article court, aussi long que large; le 2<sup>e</sup> étroit à sa base, presque aussi épais à son sommet que le premier et deux fois aussi long que lui; les 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> égaux, aussi longs que larges, les suivants courts, serrés, progressivement plus épais; massue allongée, étroite et un peu renflée au delà du milieu, aussi longue que les 4 articles précédents.

Tête noire, ponctué, très finement sillonné en son milieu.

Prothorax un peu plus large que long, peu resserré derrière le bord antérieur, et présentant sa plus grande largeur vers son tiers antérieur; bords latéraux légèrement arrondis dans leur tiers antérieur et convergents rectilinéairement mais faiblement dans leurs deux tiers

basilaires; base presque rectiligne, notablement plus large que le bord antérieur; dessus presque plan et entièrement couvert d'une granulation fine et serrée. Écusson petit, arrondi, noir, granulé.

Élytres plus larges à la base que le prothorax dans sa plus grande largeur; épaules saillantes, largement arrondies; bords latéraux nettement sinués derrière l'épaule, parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, brusquement et fortement rétrécis dans leur dernier tiers, anguleux au sommet; calus apical un peu saillant; stries à points larges, peu profonds, et d'un diamètre égal à l'intervalle qui les sépare; interstries peu convexes, le 1<sup>er</sup> très rétréci au sommet où il se réunit au 11<sup>e</sup>, en formant un angle un peu aigu, entourant une petite fossette; les 3<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> un peu élevés à leur sommet. Dessus peu convexe sur la partie antérieure, brusquement déclive à 45° sur le dernier tiers; entièrement couvert d'une granulation fine, serrée, analogue à celle du prothorax.

Pattes testacées avec les genoux foncés, squamulées. Tibias bisinués avec, en dessous, 6-8 denticules très nets; de longs poils fins émergent de la base de ces denticules; quelques poils se montrent encore en dessus vers le sommet des tibias. Tarses testacés, allongés; 1<sup>er</sup> article pyriforme, 2<sup>e</sup> une fois et demie aussi long que le 1<sup>er</sup>, le 3<sup>e</sup> presque une fois et demie aussi long que le 2<sup>e</sup>; l'unguiculaire aussi long que les 3 précédents réunis; tous avec quelques longs poils fins au sommet.

Longueur 3,5-4 mill.

Camargue : Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).

*Types* : 2 exemplaires dans la collection de M. L. PUEL, 1 dans la mienne.

Sa massue antennaire glabre range cette espèce parmi les *Helmidomorphus*; l'allongement de ses tarses la rapproche de *B. rotundicollis* Boh.; toutefois elle se distingue aisément de ce dernier par son prothorax notablement plus dilaté antérieurement et moins resserré derrière le bord antérieur, sa massue antennaire étroite et glabre; ses élytres ont les épaules plus saillantes et plus arrondies, le calus apical moins marqué, leur sommet n'est pas renflé; les tarses sont beaucoup plus allongés, plus étroits, les denticules des tibias plus forts, etc. Sa grande taille la sépare à première vue des autres *Helmidomorphus*.

Comme l'espèce précédente, cette espèce m'a été communiquée par notre obligant collègue M. L. PUEL, dont les actives et intelligentes recherches en Camargue ont amené la découverte de nombreuses formes intéressantes.

---